

Инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата Псорилом®

Торговое наименование Псорилом®

рег. №: ЛС-000441

Лекарственная форма: Таблетки подъязычные гомеопатические

Состав на одну таблетку:

- Berberis vulgaris (берберис вульгарис) D3
- Graphites (графитес) D8
- Toxicodendron quercifolium (Токсикодендрон кверцифолиум) D12
- Fumaria officinalis (фумария официналис) D3
- Kalium bromatum (калиум броматум) D6
- Solidago virgaurea (солидаго витргаурея) D3

Вспомогательные вещества:

- Крахмал картофельный 15 мг
- Кальция стеарат 3 мг
- Лактозы моногидрат до 300мг

Описание: таблетки плоскоцилиндрической формы белого, белого с сероватым или белого с желтоватым оттенком цвета с фаской и риской.

Фармакотерапевтическая группа: Гомеопатическое средство

Клинико-фармакологическая группа: Гомеопатический препарат, применяемый при псориазе

Фармакологические свойства Многокомпонентный гомеопатический препарат, действие которого обусловлено компонентами, входящими в его состав.

Показания к применению: в комплексной терапии псориаза обыкновенного.

Противопоказания: Повышенная индивидуальная чувствительность к отдельным компонентам препарата. Возраст до 18 лет. Недостаточность лактазы, непереносимость лактозы, глюкозогалактозная мальабсорбция.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания Применение препарата возможно, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка. Необходима консультация врача.

Способ применения и дозы

По 1 таблетке 3 раза в день под язык до полного растворения за полчаса до еды или через 1 час после еды. Курс лечения 2-3 месяца. После каждого месяца приема препарата следует сделать недельный перерыв. При необходимости курс можно повторить через 1 месяц.

Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

Побочное действие

Возможны аллергические реакции. Если у вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции, или они усугубляются, или вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка Случаи передозировки до настоящего времени не были зарегистрированы.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами Применение гомеопатических препаратов не исключает лечение другими лекарственными средствами.

Особые указания

При приеме гомеопатических препаратов может отмечаться временное обострение симптомов. В этом случае следует обратиться к врачу. При появлении побочных эффектов необходимо обратиться к врачу. Информация для больных сахарным диабетом: содержание углеводов в максимальной суточной дозе препарата соответствует 0,074 хлебной единицы.

При сохранении симптомов заболевания или ухудшении состояния на фоне применения препарата в течение 14 дней следует сообщить об этом лечащему врачу.

Влияние на способность к управлению транспортными средствами и механизмами

Препарат не оказывает влияния на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (в том числе управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера и оператора).

Форма выпуска:

Таблетки подъязычные гомеопатические. По 15, 20, 30, 40, 50, 60 или 100 таблеток в банку полимерную, изготовленную из полиэтилена низкого давления с полимерной крышкой из полиэтилена высокого давления для упаковки лекарственных средств. На каждую банку наклеивают этикетку из самоклеящегося материала или бумаги писчей или этикеточной. Каждую банку вместе с инструкцией помещают в пачку из картона.

По 10 или 20 таблеток в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой печатной лакированной. По 2, 3, 4, 5, 6, 10 контурных ячейковых упаковок по 10 или 20 таблеток вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

Условия хранения:

При температуре не выше 25°C. Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности: 5 лет. Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска: отпускается без рецепта.

Производитель ЗАО «Мега Фарм» 107014, РФ, г. Москва, ул. Русаковская, д.22. Тел. +7(499)270-86-33; 270-86-32

Адрес производственной площадки: РФ, Московская область, Чеховский район, пос. Любубаны

Владелец регистрационного удостоверения/организация принимающая претензии потребителей: ООО «Алкой», г. Москва, ул. Планетная, д.11, помещение 9/8 РМ-2. Тел. +7(495)518-98-18